

Albumine-creatinineratio mg/mmol			
eGFR	Normaal <3	Matig verhoogd 3-30	Ernstig verhoogd >30
≥60 Hoog normaal of mild afgenomen (G1, G2)		Leefstijladviezen Medicatie bewaking CVRM schatting CNS als additionele risicofactor Controle 1x per jaar	Leefstijladviezen Medicatie bewaking Medicamenteuze behandeling RR 130/80mmHg en LDL ≥ 2.5 mmol/l; individuelisering streefwaarden; voorkeur RAS-remmer Influenzavaccinatie Controle 2x per jaar Verwijzing internist-nefroloog
45-59 Mild tot matig afgenomen (G3a)	Leefstijladviezen Medicatie bewaking CVRM schatting CNS als additionele risicofactor Controle 1x per jaar	Leefstijladviezen Medicatie bewaking Medicamenteuze behandeling RR 130/80mmHg en LDL ≥ 2.5 mmol/l; individuelisering streefwaarden; voorkeur RAS-remmer Influenzavaccinatie Controle 2x per jaar	Leefstijladviezen Medicatie bewaking Medicamenteuze behandeling RR 130/80mmHg en LDL ≥ 2.5 mmol/l; individuelisering streefwaarden; voorkeur RAS-remmer Influenzavaccinatie Controle 2-4 x per jaar (inclusief metabole complicaties) Verwijzing internist-nefroloog
30-44 Matig tot ernstig afgenomen (G3b)	Leefstijladviezen Medicatie bewaking Medicamenteuze behandeling RR 130/80mmHg en LDL ≥ 2.5 mmol/l; individuelisering streefwaarden Influenzavaccinatie Controle 2x per jaar	Leefstijladviezen Medicatie bewaking Medicamenteuze behandeling RR 130/80mmHg en LDL ≥ 2.5 mmol/l; individuelisering streefwaarden; voorkeur RAS-remmer Influenzavaccinatie Controle 2-4 x per jaar (inclusief metabole complicaties) Verwijzing internist-nefroloog	Leefstijladviezen Medicatie bewaking Medicamenteuze behandeling RR 130/80mmHg en LDL ≥ 2.5 mmol/l; individuelisering streefwaarden; voorkeur RAS-remmer Influenzavaccinatie Controle 2-4 x per jaar (inclusief metabole complicaties) Verwijzing internist-nefroloog
15-29 Ernstig afgenomen (G4)	Leefstijladviezen Medicatie bewaking Medicamenteuze behandeling RR 130/80mmHg en LDL ≥ 2.5 mmol/l; individuelisering streefwaarden Influenzavaccinatie Overweeg nierfunctie vervangende therapie Controle 2-4 x per jaar (inclusief metabole complicaties) Verwijzing internist-nefroloog	Leefstijladviezen Medicatie bewaking Medicamenteuze behandeling RR 130/80mmHg en LDL ≥ 2.5 mmol/l; individuelisering streefwaarden; voorkeur RAS-remmer Influenzavaccinatie Overweeg nierfunctie vervangende therapie Controle 2-4 x per jaar (inclusief metabole complicaties) Verwijzing internist-nefroloog	Leefstijladviezen Medicatie bewaking Medicamenteuze behandeling RR 130/80mmHg en LDL ≥ 2.5 mmol/l; individuelisering streefwaarden; voorkeur RAS-remmer Influenzavaccinatie Overweeg nierfunctie vervangende therapie Controle 2-4 x per jaar (inclusief metabole complicaties) Verwijzing internist-nefroloog
<15 Nierfalen (G5)	Leefstijladviezen Medicatiebewaking Behandeling gericht op maximaal behoud van nierfunctie en behandeling van symptomen Influenzavaccinatie Controle ≥ 4 x per jaar (inclusief metabole complicaties) Verwijzing internist-nefroloog	Leefstijladviezen Medicatiebewaking Behandeling gericht op maximaal behoud van nierfunctie en behandeling van symptomen Influenzavaccinatie Controle ≥ 4 x per jaar (inclusief metabole complicaties) Verwijzing internist-nefroloog	Leefstijladviezen Medicatiebewaking Behandeling gericht op maximaal behoud van nierfunctie en behandeling van symptomen Influenzavaccinatie Controle ≥ 4 x per jaar (inclusief metabole complicaties) Verwijzing internist-nefroloog



Geen CNS



Mild verhoogd risico



Matig verhoogd risico



Sterk verhoogd risico