

Hydrochloorthiazide en huidkanker

Algemeen

Deens onderzoek heeft aangetoond dat patiënten die langdurig hydrochloorthiazide (HCT) gebruiken een verhoogd risico hebben op twee vormen van huidkanker: basaalcelcarcinoom en plaveiselcelcarcinoom. Hydrochloorthiazide maakt de huid gevoeliger voor schade door uv-straling van zonlicht en zonnebanken.

Identificatie patiënten

Maak een selectie van alle mensen die HCT of een combinatiepreparaat met HCT gebruiken. De lijst met combipreparaten is lang. Praktisch kun je dan kiezen voor de kortere ATC codes: C03AA, C03EA, C07BB, C09BA, C09DA, C09DX, C09XA. Maak ook een selectie van alle mensen met een ICPC basaalcelcarcinoom (S77.01) en plaveiselcelcarcinoom (S77.02). Indien je niet zeker weet of alles goed in subcodes staat kun je ook S77 uitdraaien en dan per patiënt kijken of het basaalcelcarcinoom of plaveiselcarcinoom is.

Advies aan zorgverleners

- Informeer patiënten die HCT alleen of in combinatie met andere geneesmiddelen gebruiken, over het risico op basaalcelcarcinoom en plaveiselcelcarcinoom bij langdurig gebruik.
- Geef zondavies en adviezen tav adequate bescherming

Het gebruik van HCT moet worden heroverwogen bij patiënten die al eerder huidkanker hebben gehad omdat het risico op nog een keer huidkanker (extra) verhoogd is.

Adviezen aan patiënten

- Zonadvies: Overmatige blootstelling aan zonlicht en uv-straling te beperken en hiervoor adequate bescherming te gebruiken
- Controleren van de huid:
Nieuwe laesies of veranderingen van bestaande laesies met verdachte kenmerken melden aan hun behandelend arts
- Handige websites
<https://www.cbg-meb.nl/documenten/publicaties/2018/10/30/hct-informatie-voor-patienten>
<https://www.kanker.nl/kankersoorten/huidkanker/wat-is/huidkanker>
<https://www.thuisarts.nl/basaalcelkanker/ik-heb-basaalcelkanker>
<https://www.thuisarts.nl/plaveiselcelkanker/ik-heb-plaveiselcelkanker>

Voor meer uitgebreide informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met het kwaliteitsteam KZF.